

# CIANAMAX 50% SL

## INFORMACION GENERAL DEL PRODUCTO

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Ingrediente activo (ISO): | Cianamida hidrogenada (Cyanamide) 500 g/l |
| N° Registro Nacional:     | F-2025-2629                               |
| Formulación:              | Concentrado soluble (SL)                  |
| Uso:                      | Regulador de crecimiento                  |

## MODO DE ACCIÓN

**CIANAMAX 50% SL** es un regulador de crecimiento de plantas destinado para cultivos frutales. **CIANAMAX 50% SL**, actúa como defoliante y estimula la brotación de yemas produciendo la caída de hojas, estimulando así una brotación de yemas homogénea y abundante.

## COMPATIBILIDAD

No mezclar **CIANAMAX 50% SL** con fertilizantes foliares, herbicidas ni con otros plaguicidas, siendo compatible con surfactantes no iónicos.

## PRECAUCIONES:

Producto corrosivo, irritante ocular y dérmico.

## METODO DE EMPLEO

Para su adecuada aplicación, llenar hasta la mitad el tanque de aplicación, luego aplicar el producto a la dosis recomendada, completar con agua, agitar y aplicar. Realizar una aplicación uniforme sobre hojas y ramas. Utilizar equipo de aspersion manual y calibrado.

## EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

En vid, aplicar durante la etapa de agoste del cultivo, las aplicaciones deben ser dirigidas sobre los sarmientos o ramas con yemas productivas. Efectuar una aplicación.

## RECOMENDACIONES BASICAS

Lea la etiqueta y siga las instrucciones y recomendaciones del producto. Utilice ropa adecuada: pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice el triple lavado y vierta la solución en la mezcla de aplicación.

## PRESENTACIONES

Galonera 20 L

Galonera 4 L

Frasco 1 L

Frasco 500 ml

## RECOMENDACIÓN DE USO:

| Cultivo                       | Dosis                  | Época de aplicación  | Forma de aplicación |
|-------------------------------|------------------------|--|---------------------|
| Vid ( <i>Vitis vinífera</i> ) | 5 l/200 litros de agua | En vid, aplicar durante la etapa de agoste del cultivo, las aplicaciones deben ser dirigidas sobre los sarmientos o ramas con yemas productivas. Efectuar una aplicación por campaña agrícola. | Foliar              |

Fecha de actualización: marzo 2025

Elaborado por el Área de Registros