

# DECISIVO®

## INFORMACION GENERAL DEL PRODUCTO

Ingrediente activo (ISO):	Myclobutanil 400 g/kg
N° Registro Nacional:	85-F9/NA
Formulación:	Polvo Mojable (WP)
Uso:	Fungicida de uso agrícola

## MODO DE ACCIÓN

**DECISIVO®** es un fungicida sistémico, de control preventivo, curativo y erradicante de enfermedades fúngicas susceptibles. Es un inhibidor de la biosíntesis de esteroides (SBI), que inhibe principalmente el paso de desmetilación de C-14 en la ruta de biosíntesis de esteroides fúngicos (DMI). Su acción afecta la síntesis de la membrana celular; causa la muerte del haustorio (micelio de penetración), tan pronto como es emitido. En infecciones presentes detiene el crecimiento del micelio, y así también previene la esporulación por la muerte temprana del micelio, impidiendo la colonización del hongo, el avance de la infección en los tejidos, y su posterior dispersión. Pertenece al grupo de la FRAC G1.

## COMPATIBILIDAD

**DECISIVO®** es incompatible con productos fuertemente oxidantes y alcalinos; puede ser compatible con algunos agroquímicos, Realizar una prueba de compatibilidad a escala antes de usar el producto.

## TOXICIDAD: Categoría Toxicológica

Toxicidad Oral: LD50 (rata) > 2000 mg/Kg

Toxicidad Dérmica: LD50 (rata) > 2000 mg/Kg

Toxicidad por Inhalación: LC50 (rata) > 5.32 mg/L (aire, 4h)

Irritación Cutánea: Ligera irritación.

Irritación Ocular: Causa irritación moderada a los ojos

Sensibilización Cutánea: No sensibilizante.

## METODO DE EMPLEO

Llenar el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad de su capacidad, luego agregar la dosis recomendada y completar el volumen total del tanque siempre con los agitadores en marcha. Aplicar en forma de aspersión cubriendo todo el follaje de forma homogénea. Aplicar el producto en el cultivo de tomate riñón bajo condiciones de invernadero.

## EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

**DECISIVO®** puede aplicarse dos veces, cuando el cultivo se encuentre en el estado fenológico de floración / fructificación y cuando se evidencie la presencia de la enfermedad.

## RECOMENDACIONES BASICAS

Lea la etiqueta y siga las instrucciones y recomendaciones del producto. Utilice ropa adecuada: pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice el triple lavado y vierta la solución en la mezcla de aplicación.

## PRESENTACIONES

Bolsa de 1 kg  
Bolsa de 400 gramos  
Bolsa de 100 gramos  
Bolsa de 40 gramos

## RECOMENDACIÓN DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis Kg/ha	P. C (días)
	Nombre común	Nombre científico		
Tomate riñón ( <i>Lycopersicon esculentum</i> )	Cenicilla	<i>Oidium sp.</i>	0.25	1

Volumen de agua Tomate riñón: 700 - 800 l/ha

PC. Periodo de carencia

Fecha de actualización: febrero 2024

Elaborado por el Área de Registros