

POINTER®

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Nombre común	:	Clorpirifos 480 gr/Kg
Formulación	:	Concentrado Emulsionable - EC
N° Registro Nacional	:	26 - I 17/ NA
Uso	:	Insecticida de uso agrícola

MODO DE ACCIÓN: POINTER es un insecticida ORGANOFOSFORADO no sistémico que actúa por contacto e ingestión, inhibiendo la enzima acetilcolinesterasa en los insectos, responsable de la degradación de la acetilcolina (la acumulación de la misma resulta tóxica para insectos y plagas); se recomienda para el control de plagas masticadoras, barrenadoras y perforadoras, tanto las que atacan al follaje de las hortalizas y otros cultivos, así como también las que atacan en el suelo.

COMPATIBILIDAD: POINTER no es compatible con productos de reacción alcalina.

TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO: Moderadamente peligroso

DL ₅₀ Oral Aguda	:	DL ₅₀ ratas 300 mg/kg
DL ₅₀ Dermal Aguda	:	DL ₅₀ conejos > 2000 mg/kg
CL ₅₀ inhalatoria	:	2.41 mg/L aire
Irritación dermal	:	Moderadamente irritante a la piel (conejo)
Irritación ocular	:	Levemente irritante a los ojos (conejo)

MÉTODO DE EMPLEO: Para su aplicación llenar el tanque del equipo de aspersion con agua hasta la mitad, agregar la cantidad de producto a aplicar y mezclar; luego completar con agua hasta su capacidad total, mezclar y aplicar.

Utilizar equipo de aspersion, manual o mecánica procurándose que sea uniforme.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Se recomienda las aplicaciones en cualquier etapa del cultivo, por lo general cada dos semanas dependiendo de la plaga.

RECOMENDACIONES BÁSICAS:

Lea la etiqueta y siga las instrucciones y recomendaciones del producto. Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el

producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice el triple lavado en envases para líquidos. El pH ideal de la solución para la aplicación es de 7, estable en el rango de pH de 7 - 8.

PRESENTACIONES

Frasco de 1 L

Frasco de 250 ml

Frasco de 100 ml

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	PLAGA		Dosis L /Ha	Periodo de carencia (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Maíz	"Cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	1.25	21	0.05

LMR: Límite máximo de residuo.